


Fractures scapulaires

Rares. Traumatisme violent, mécanisme direct ++.

Classification



Imagerie → Radiographie +/- scanner


- ◆ Epaule face & profil
- ◆ Scanner en cas de doute diagnostique ou doute sur un déplacement
- ◆ **Radiographie thoracique systématique une fois le diagnostic établi**

Fracture du bord inférieur de la glène = marqueur de luxation gléno-humérale

Vérifier l'absence...

- ❖ ... **de lésions associées**
 - ◆ **Fracture claviculaire (30%)**
 - ◆ Luxation acromio-claviculaire
→ Epaule flottante
 - ◆ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus
- ❖ ... **de complications**
 - ◆ **Complications thoraciques (40%)** : fracture de côtes, lésions pleuro-parenchymateuses
 - ◆ **Complications générales (30%)** : celles du traumatisé grave
 - ◆ Vasculo-nerveuses (rares) : vaisseaux sous-claviers, vaisseaux axillaires et plexus brachial

Prise en charge (hors complication)



Information du patient

- ◆ Rééducation douce une fois la phase douloureuse passée
- ◆ Séquelles : douleur résiduelle ; raideur / mobilisation altérée ; pseudarthrose